

関係各位

薬局だより

薬剤部

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

1) 新規採用薬品(7月1日より)

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
スインプロイク錠 0.2mg (薬価:272.1/1錠)	1錠: ナルデメジン0.2mg	塩野義	成人:1回0.2mg1日1回	オピオイド誘発性便秘症	産婦人科
PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL (薬価:22.10/1mL)	1mL: ヨウ素2mg	日本 点眼薬	精製水又は0.9%食塩水 で4~8倍に希釈して使用	角膜ヘルペス、洗眼殺菌	眼科
リンデロン点眼・点耳・点 鼻液0.1%5mL (薬価:69.00/1mL)	1mL: ベタメタゾンリン酸エステル ナトリウム1mg	塩野義	1回適量を1日1~数回 点耳、点鼻、耳浴、ネプ ライザー、タンポン又は 患部注入	眼科用:外眼部・前眼部 の炎症性疾患の対症療法 耳鼻科用:外耳・中耳又は 上気道の炎症性・アレルギー 性疾患、術後措置	
レギュニールLCa1. 5腹 膜透析液(ツインバッグ・ UVツインバッグ) 1000mL(薬価:1,288/1 袋) 1500mL(薬価:1,531/1 袋) 2000mL(薬価:1,785/1 袋)	上室: ブドウ糖、乳酸ナトリウム 液、塩化カルシウム水和 物、塩化マグネシウム、 塩化ナトリウム、塩酸 下室: 炭酸水素ナトリウム、塩 化ナトリウム、水酸化ナト リウム	バクスター	腹腔内に注入し、透析治 療を目的とした液として 使用。成人:1回1.5~ 2Lを腹腔内に注入。4~ 8時間滯液、効果期待後 に排液除去。体液過剰1 kg/日以下:レギュニール LCa1.5腹膜透析液のみ 3~4回の連続操作を継 続。体液過剰1kg/日以 上:レギュニールLCa2.5 透析液を3~5回/日連 続操作を継続。(2.5腹膜 透析液1~4回又は4.25 腹膜透析液1~2回の処 方にて1.5腹膜透析液と 組み合わせ操作) 注入、排液速度は300mL /分以下。	慢性腎不全患者におけ る腹膜透析(高マグネシ ウム血症の改善が不十 分な場合で、かつカルシ ウム製剤や活性型ピタミ ンD製剤の投与により高 カルシウム血症をきたす 恐れのある場合に用い る)	循環器・ 腎臓内科
レギュニールLCa2. 5腹 膜透析液(ツインバッグ・ UVツインバッグ) 1000mL(薬価:1,345/1 袋) 1500mL(薬価:1,553/1 袋) 2000mL(薬価:1,808/1 袋)					
レギュニールLCa1. 5腹 膜透析液シングルパッ グ・機器専用 2500mL (薬価:1,207/1袋) 5000mL (薬価:2,415/1袋)					

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
レギュニールLCa2. 5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 2500mL (薬価:1,264/1袋) 5000mL (薬価:2,528/1袋)		バクスター			循環器・腎臓内科
エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ・機器専用2000mL (薬価:1,126/1袋)	1袋: イコデキストリン、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、塩化ナトリウム		1日1回のみでの使用。 1日3~5回交換のうち1回の交換において本剤1.5L~2Lを腹腔内に注入。 8~12時間滞液、効果期待後に排液除去。 注入、排液速度は300mL/分以下。	慢性腎不全患者における腹膜透析	
ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 シングルバッグ5000mL (薬価:2,010/1袋)	上室: ブドウ糖、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、 下室: 乳酸ナトリウム、塩化ナトリウム		1回1.5~2Lを腹腔内注入、4~8時間滞液、効果期待後に排液除去。1日当たり3~5回連続操作。	慢性腎不全患者の体液、電解質の平衡異常の補正並びに透析可能な代謝有害物質の除去	

2) 販売中止に伴う変更薬品(在庫なくなり次第)

薬品名	成分	メーカー	薬効分類	備考	依頼科
アルロイドG内用液5% (薬価:17.10/10mL)	100mL: アルギン酸ナトリウム5g	カイゲンファーマ	消化性潰瘍治療薬	アルクレイン内用液5% (薬価:6.60/10mL) 販売中止	薬剤部
ソセゴン注射液15mg (薬価:65.00/1管)	1管: ペンタゾシン15mg	丸石	非麻薬性鎮痛薬	ペンタジン注射液15mg (薬価:64.00/1管) 販売中止	
ペルタゾン錠25mg (薬価:36.90/1錠)	1錠: ペンタゾシン25mg	あすか製薬		ペンタジン錠25mg (薬価:39.00/1錠) 販売中止	

3) 削除品目(在庫なくなり次第)

- 「点眼・点鼻用リンデロンA液5mL」 → 「リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%5mL」採用のため
 - 「ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(排液用バッグ付き)1000mL,1500mL,2000mL,2500mL」 → 「レギュニールLca腹膜透析液」採用のため
 - 「ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(排液用バッグ付き)1000mL,1500mL,2000mL,2500mL」
 - 「ダイアニール-N PD-4 4.25腹膜透析液(排液用バッグ付き)2000mL」 → 「エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ・機器専用2000mL」採用のため
 - 「ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液(排液用バッグ付き)1500mL,2000mL」 → 「ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液シングルバッグ5000mL」採用のため
 - 「アモキシサンカプセル25mg」
 - 「エースコール錠2mg」
 - 「ドレニゾンテープ4 μ g/cm²」
 - 「注射用ビクシリンS100」
 - 「ベストロン耳鼻科用1%」
- } → 購入実績ないため

4) 変更薬品(在庫なくなり次第)

変更前薬品名		変更後薬品名
1 アクトス錠15	→	ピオグリタゾン0D錠15mg「DSEP」
2 アザルフィジンEN錠250mg	→	サラソスルファピリジン腸溶錠250mg「SN」
3 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	→	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」
4 キプレス錠10mg	→	モンテルカスト0D錠10mg「タカタ」
5 グリメピリド錠1mg「三和」	→	グリメピリド0D錠1mg「EMEC」
6 コムタン錠100mg	→	エンタカポン錠100mg「KN」
7 サイレース錠1mg	→	フルニトラゼパム錠1mg「JG」
8 セファドール錠25mg	→	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「TCK」
9 ティーエスワン配合0D錠T20	→	エスワンタイホウ配合0D錠T20
10 ティーエスワン配合0D錠T25	→	エスワンタイホウ配合0D錠T25
11 ネオフィリン注250mg	→	ネオフィリン注PL250mg
12 パキシル錠10mg	→	パロキセチン錠10mg「アスペン」
13 パナルジン錠100mg	→	チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」
14 ファスティック錠90	→	ナテグリニド錠90mg「日医工」
15 ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」	→	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
16 ヘルベッサ-Rカプセル100mg	→	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
17 ミカルディス錠20mg	→	テルミサルタン錠20mg「DSEP」
18 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	→	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」
19 リスパダール錠1mg	→	リスペリドン0D錠1mg「サワイ」
20 レバミピド0D錠100mg「明治」	→	レバミピド0D錠100mg「NS」
21 ワイパックス錠0.5	→	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
22 ワソラン錠40mg	→	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
23 球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」	→	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」