

irAE（免疫関連有害事象）確認シート

地方独立行政法人 奈良県立病院機構
奈良県総合医療センター薬剤部

当院では免疫チェックポイント阻害薬（以下 ICI：オプジーボ、キイトルーダ、ヤーボイ、テセントリク、イミフィンジ等）の治療開始時に患者さんのお薬手帳に ICI シールを貼付しております。お薬手帳に当院の ICI シールを貼付されている患者さんが来局されましたら、以下項目を患者さんに聴取頂き、以下ご対応いただけるようご協力をお願いいたします。

また、ICI シールの貼付がなくても当院の化学療法情報提供書により ICI 投与歴が確認できれば同様のご対応をお願いいたします。

グレード 0：ご対応不要

グレード 1：当院のトレーシングレポートにて報告

グレード 2 以上：当院外来の主治医宛に電話にて疑義照会

症状一覧	グレード			
	0	1	2	3
呼吸困難 (息苦しい)	ない	階段や坂道を登る際に息切れがある	ゆっくり歩行した際に息切れはあるが、日常生活はできる	息切れのため、身の回りのこともできない
浮腫	ない	夕方にむくみがある	朝も改善しないむくみがある	急激なむくみとそれに伴う体重増加があり、身の回りのこともできない
倦怠感 (体のだるさ)	ない	動くのだるいが休むと回復する	いつもだるさがあるが、日常生活はできる	だるさのため、日常生活ができない
食欲不振	ない	食欲低下を感じるが食事量は変わらない	食欲低下を感じ、食事量が減った	経腸静脈栄養を要する
嘔吐	ない	1日に1-2回吐く	1日に3-5回吐く	1日に6回以上吐く
下痢	ない	普段と比べ1日1-3回下痢が増えた	普段と比べ1日4-6回下痢が増えた	普段と比べ1日に7回以上下痢が増えた
手足のしびれ (部位：)	ない	手足に違和感がある	しびれを感じるが、日常生活はできる	しびれのため、身の回りのこともできない
筋力低下 (力が入りにくい)	ない	明らかな筋力低下はないが、力の入りにくさを感じる	明らかな筋力低下はあるが、日常生活はできる	明らかな筋力低下のため、身の回りのこともできない