

関係各位

薬局だより

薬剤部

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

- 1) 新規採用薬品(ケイセントラ静注用500・1000、オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」は3月1日～、FDGスキャン注は4月1日～、その他の薬品は5月1日～)

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
ケイセントラ静注用 500 (薬価: 35,004/1瓶) 1000 (薬価: 65,225/1瓶)	1瓶(溶解液40mL付): 人プロトロンビン複合体 500IU、1000IU	CSL ベーリング	溶解液で溶解後、以下を 単回静注。 投与前PT-INR2～4未 満: 1回25IU/kg(100kg 超; 25000IU)PT-INR4～ 6: 1回35IU/kg(100kg超; 35000IU)PT-INR>6: 1回 50IU/kg(100kg超; 5000IU)。	ビタミンK拮抗薬投与中 患者における急性重篤 出血時、又は重大な出 血が予想される緊急を要 する手術・処置施行時の 出血傾向抑制	救急 診療科
FDGスキャン注 (薬価未収載、 納入価40,000/1瓶)	1瓶: フルデオキシグルコース (¹⁸ F)185MBq	日本メジフ ジックス	成人: 1瓶(検定日時に おいて185MBq)静脈内 投与し撮像。最小 74MBq、最大370MBq。	悪性腫瘍の診断、虚血 性心疾患の診断、難治 部分てんかん外科切 除が必要とされる場合の 脳グルコース代謝異常 領域の診断	放射線科
レボメプロマジン錠25mg 「ツルハラ」 (薬価: 5.6/1錠)	1錠: レボメプロマジン25mg	鶴原	1日25～200mg、分服。	統合失調症、躁病、うつ 病における不安・緊張	精神科
ハロマンズ注50mg (薬価: 1,679/1管)	1管: ハロペリドールデカン酸 エステル70.52mg(ハロペ リドールとして50mg)	大日本 住友	1回50～150mg、4週間 隔、筋注。 初回用量: 経口ハロペリ ドール1日用量の10～ 15倍を目安とし、少量よ り開始、100mgを超えな い。	統合失調症	
ロナセン錠4mg (薬価: 147.8/1錠)	1錠: プロナンセリン4mg	大日本 住友	1回4mg、1日2回より開 始し漸増。 維持: 1日8～16mg、2回 分服。 最大: 1日24mg。		
ペロスピロン塩酸塩錠 8mg「アメル」 (薬価: 18.7/1錠)	1錠: ペロスピロン塩酸塩8mg	共和薬品	1回4mg、1日3回より開 始し漸増。 維持: 1日12～48mg、3 回分服。 最大: 1日48mg。		

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼料
オランザピンOD錠 2.5mg「DSEP」 (薬価: 44.1/1錠)	1錠: オランザピン2.5mg	第一三共 エスファ	①1日1回5～10mgより開始。維持: 1日1回10mg ②1日1回10mg。 ③1日1回5mgより開始。1日1回10mgに増量(就寝前)。最大: 1日20mg。 ④(他の制吐薬と併用) 1日1回5mg。最大: 1日10mg6日間。	①統合失調症 ②双極性障害における躁症状の改善 ③双極性障害におけるうつ症状の改善 ④抗悪性腫瘍薬投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)	精神科
エビリファイ内用液0.1% (薬価: 83.4/1包)	1包: アリピプラゾール1mg	大塚製薬	①開始量: 1日6～12mg、維持量: 1日6～24mg、1～2回分服。 ②開始量: 1日1回24mg、維持量1日1回12～24mg。最大: 1日30mg。 ③(SSRI又はSNRI等の抗うつ薬と併用) 1日1回3mg。増量幅は1日量として3mg、1日量は15mgを超えない。 ④開始量: 1日1回1mg、維持量: 1日1回1～15mg。増量幅は1日量として3mg、1日量は15mgを超えない。	①統合失調症 ②双極性障害における躁症状の改善 ③うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合) ④小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	
ゾテピン錠50mg 「アメル」 (薬価: 11.4/1錠)	1錠: ゾテピン50mg	共和薬品	ゾテピンとして1日75～150mg、分服。1日450mgまで増量可。	統合失調症	
アナフラニール錠25mg (薬価: 19.2/1錠)	1錠: クロミプラミン塩酸塩25mg	アルフレッサ ファーマ	①1日50～100mg、1～3回分服。最大: 1日225mg。 ②6歳未満: 1日10～25mg、6歳以上: 1日20～50mg、1～2回分服。 ③1日10～75mg、1～3分服。	①精神科領域におけるうつ病・うつ状態 ②遺尿症 ③ナルコレプシーに伴う情動脱力発作	
アモキシサンカプセル25mg (薬価: 13.1/1C)	1カプセル: アモキシサピン25mg	ファイザー	アモキシサピンとして1日25～75mg、1～数回分服。効果不十分: 1日150mg。最大: 1日300mg。	うつ病・うつ状態	
ノリレン錠10mg (薬価: 5.6/1錠)	1錠: ノリトリプチリン塩酸塩10mg	大日本住友	1回10～25mg、1日3回又はその1日量を2回分服。最大: 1日150mg、2～3回分服。	精神科領域におけるうつ病・うつ状態	
テトラミド錠10mg (薬価: 15.3/1錠)	1錠: ミアンセリン塩酸塩10mg	MSD	初期量: 1日30mg、分服。1日60mgまで増量。1日1回の場合夕食後又は就寝前。	うつ病・うつ状態	
レクサプロ錠10mg (薬価: 216.4/1錠)	1錠: エスシタロプラムシュウ酸塩10mg	持田	1日1回10mg(夕食後)、1週間以上間隔をあけて増量。1日20mgを超えない。	うつ病・うつ状態、社会不安障害	

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼料
ミルナシبران塩酸塩錠 25mg「サワイ」 (薬価: 18.5/1錠)	1錠: ミルナシبران塩酸塩 25mg	沢井	初期量: 1日25mg、1日 100mgまで漸増、食後2 ~3回分服。 高齢者: 初期1日25mg、1 日60mgまで漸増、食後2 ~3回分服。	うつ病・うつ状態	
リフレックス錠15mg (薬価: 170.8/1錠)	1錠: ミルタザピン15mg	Meiji Seika ファルマ	初期量: 1日15mg 1日15~30mg、就寝前。 増量は1週間以上間隔を あけて1日15mgずつ。1日 45mgを超えない		
クアゼパム錠15mg 「MNP」 (薬価: 50.2/1錠)	1錠: クアゼパム15mg	日新製薬	①1回20mg、就寝前。1 日最高30mg。 ②1回15~30mg、就寝 前。1日最高30mg。	①不眠症 ②麻酔前投薬	
タンドスピロンクエン酸塩 錠10mg「トーワ」 (薬価: 16.9/1錠)	1錠: タンドスピロンクエン酸塩 10mg	東和薬品	1日30mg、3回分服。1日 60mgまで可。	心身症の身体症候・抑うつ・ 不安・焦燥・睡眠障 害、神経症の抑うつ・恐 怖	
ラミクタール錠 25mg (薬価: 87/1錠) 100mg (薬価: 232.7/1錠)	1錠: ラモトリギン25mg、 100mg	グラクソ・スミ スクライン	①1日1回25mg、2週間。 次の2週間1日1回50mg、 5週目1日100mg1~2回 分服。その後1~2週間ご とに1日最大100mgずつ 漸増。維持: 1日100~ 200mg、1~2回分服。増 量は1週間以上あけ、1 日最大100mgずつ。最 大: 1日400mgまで、1~2 回分服。 ②③バルプロ酸ナトリウ ム併用時、バルプロ酸は 併用せず本剤のグルク ロン酸抱合誘導薬併用 時、どちらにも当たらない 場合で用法・用量が異な るため詳細は添付文書 参照。 ④小児: 1日0.3mg/kg、1 ~2回分服、2週間。次の 2週間0.6mg/kg、1~2回 分服。その後1~2週間 毎に1日最大0.6mg/kgず つ漸増。維持: 1日1~10 mg/kg、1~2回分服。増 量: 1週間以上の間隔を あけて1日最大0.6mg/kg ずつ、1~2回分服。最 大: 1日200mg、1~2回分 服。	①てんかん患者の部分 発作(二次性全般化発作 を含む)、強直間代発作 に対する単剤療法 ②他の抗てんかん薬で 十分な効果が認められ ないてんかん患者の部 分発作(二次性全般化発 作を含む)、強直間代発 作、Lennox-Gastaut症 候群における全般発作 にたいする抗てんかん薬 との併用療法 ③双極性障害における 気分エピソードの再発・ 再燃抑制 ④てんかん患者の定型 欠神発作に対する単剤 療法	精神科

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
イクセロンパッチ 4.5mg (薬価: 346.8/1枚) 9mg (薬価: 390.5/1枚)	1枚: リバスチグミン4.5mg、 9mg	ノバルティス ファーマ	開始: 1日1回4.5mgから、 4週ごとに4.5mgずつ増量。 維持: 1日1回18mg。状 態に応じ9mgから開始、4 週後に18mgに増量も可。 背部、上腕部、胸部のい ずれかに貼付。24時間 毎に貼り替える。	軽度及び中等度のアル ツハイマー型認知症にお ける認知症状の進行抑 制	精神科
レミニールOD錠4mg (薬価: 107.1/1錠)	1錠: ガランタミン臭化水素酸 塩4mg	武田	①開始: 1回4mg、1日2 回。4週間後に1回8mg、1 日2回に増量。最大: 変 更前の用量で4週間以上 投与後、1回12mg、1日2 回まで。		

2) 規格追加薬品

薬品名	成分	メーカー	薬効分類	備考	依頼科
献血ヴェノグロブリン IH5%静注5g/100mL (薬価: 41,843/1瓶)	1瓶: ポリエチレングリコール 処理人免疫グロブリン5g	日本血液 製剤機構	血液製剤	献血ヴェノグロブリンIH5%静 注2.5g/50mL (薬価: 22,295/1瓶)併用	薬剤部

3) 販売中止に伴う変更薬品(在庫なくなり次第)

薬品名	成分	メーカー	薬効分類	備考	依頼科
アミノレバンEN配合散「フ ルーツ」味 (薬価: 480.5/1袋)	1袋: 50g、各種アミノ散配合 210kcal	大塚	肝不全用経腸栄養剤	アミノレバンEN配合散 (薬価: 480.5/1袋)から変更	薬剤部
クリアクター静注用80万 (薬価: 85,140/1瓶)	1瓶: モンテプララーゼ(遺伝子 組み換え)80万IU	エーザイ	血栓溶解剤	クリアクター静注用160万 (薬価: 167,635/1瓶)から変 更	

4) 剤型変更(在庫なくなり次第)

薬品名	成分	メーカー	薬効分類	備考	依頼科
アスピリンドライ シロップ2% (薬価: 6.4/1g)	1g: チペピジンヒベンズ酸塩 20mg	ニプロES ファーマ	中枢性非麻薬性鎮咳薬	アスピリン散10% (薬価: 10.2/1g)から変更	薬剤部

5) 変更薬品(在庫なくなり次第)

変更前薬品名		変更後薬品名
1 テノーミン錠50	→	アテノロール錠50mg「ファイザー」
2 ウラリットU配合散	→	クエンメット配合散
3 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「フソー」	→	ロペラミド錠1mg「EMEC」
4 リツキサン注10mg/mL(100mg/1瓶)	→	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
5 リツキサン注10mg/mL(500mg/1瓶)	→	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
6 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」	→	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」
7 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」

6) 削除薬品

販売中止による削除

- ・E・P・ホルモンデポ一筋注
- ・ボセルモンデポ一筋注

期限切れにつき下記の薬品削除

- ・オキサロールローション25 μ g/g 10g(乾癬治療薬)
- ・キリット注5%500mL(キシリトール製剤輸液)
- ・ニコリンH注射液0.5g(脳梗塞治療薬)
- ・リンデロン坐剤0.5mg(副腎皮質ステロイド)
- ・マイスタン細粒1%(抗てんかん薬)
- ・ミリプラ動注用70mg、ミリプラ用懸濁用液4mL(肝細胞癌におけるリピオドリゼーション)