

関係各位

薬局だより

薬剤部

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

1) 新規採用薬品

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
ペリオクリン歯科用軟膏 0.5g (薬価: 598.1/1シリンジ)	0.5g: ミノサイクリン塩酸塩 10mg(力価)	サンスター	1週に1回、患部歯周ポケット内に充満する量を注入。	歯周組織炎	口腔外科
デスパコーワ口腔用クリーム5g (薬価: 157.5/1本)	5g: クロルヘキシジン塩酸塩 15mg、ジフェンヒドラミン サリチル酸塩5mg、ヒドロ コルチゾン酢酸エステル 25mg、濃ベンザルコニウ ム塩化物液50 2mg	興和創薬	適量を1日3~4回炎症部 位に塗布。	アフタ性口内炎、孤立性 アフタ、褥瘡性潰瘍、変 遷性歯周炎	
ヒノポロン口腔用軟膏5g (薬価: 863.5/1本)	5g: ヒノキチオール5mg、ヒド ロコルチゾン酢酸エステ ル25mg、アミノ安息香酸 エチル75mg	昭和薬品 化工	十分清拭乾燥した患部 に1日1回適量を注入。又 は、塗布する場合、患部 を清拭したのち、通常1 日1~3回適量を使用。	急性歯肉炎、辺縁性歯 周炎	
ネオステリングリーンうがい液0.2%40mL (薬価216/1瓶)	40mL: ベンゼトニウム塩化物 0.08g	日本歯科 薬品	口腔内の消毒:ベンゼト ニウム塩化物として 0.004%(50倍希釈)溶液 として洗口。 抜歯層の感染予防:ベン ゼトニウム塩化物として 0.01~0.02%(10~20倍 希釈)溶液として洗浄。	口腔内の消毒、抜歯層 の感染予防	
歯科用キシロカインカートリッジ1.8mL (薬価: 78.2/1カートリッジ)	1カートリッジ: リドカイン塩酸塩36mg、 アドレナリン0.0225mg	デンツプライ イシロナ	浸潤麻酔又は伝達麻酔 には、成人0.3~1.8mL(リ ドカイン塩酸塩として6~ 36mg、アドレナリンとして 0.00375~0.0225mg)を 使用。口腔外科領域の	歯科領域における浸潤 麻酔又は伝達麻酔	
歯科用シタネストオクタプレシンカートリッジ1.8mL (薬価: 68.8/1カートリッジ)	1カートリッジ: プロピトカイン塩酸塩 54mg、フェリプレシン 0.054単位		1回1管を注射。 麻酔部位、麻酔手技、手 術術式、年齢などにより 適宜増減。	歯科・口腔外科領域の手 術・処置における浸潤・ 伝達麻酔	
スキャンドネストカートリッジ3%1.8mL (薬価: 92/1カートリッジ)	1カートリッジ: メピバカイン塩酸塩54mg	日本歯科 薬品	1回1管を使用。 麻酔部位、麻酔手技、手 術術式、年齢などにより 適宜増減。ただし、増量 する場合には注意すること。	歯科・口腔外科領域にお ける浸潤麻酔	

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
ピーソカイン歯科用ゼリー20%20g (薬価:1,334/1本)	20g: アミノ安息香酸エチル4g	ビーブランド・メ ディコーデンタル	本剤適量を局所に塗布。	歯科領域における表面麻酔	口腔外科
サホライド液歯科用38%5mL (薬価未収載. 納入価:2,800/1瓶)	5mL: フッ化ジアンミン銀 1900mg	ビーブランド・メ ディコーデンタル	小綿球に薬液数滴を浸ませ3~4分間塗布。患歯数、症状により適宜増減。	初期う蝕の進行抑制、二次う蝕の抑制、象牙質知覚過敏症の抑制(象牙質鈍麻)	
クレオドン10mL (薬価未収載. 納入価:1,600/1瓶)	1瓶: グアヤコール10mL	ネオ製薬 工業	適量を患部に貼付	齶窩及び根管の消毒、 歯髄炎の鎮痛鎮静、根 端(尖)性歯周組織炎の 鎮痛鎮静	
メトコール10mL (薬価未収載. 納入価:1,900/1瓶)	10mL: グアヤコール7g、パラク ロルフェノール3g				
ペリオドン2g (薬価未収載. 納入価:1,900/1本)	2g: パラホルムアルデヒド 1g、ジブカイン塩酸塩 0.52g				
キャナルクリーナー歯科 用液10%30mL (薬価未収載. 納入価:1,100/1瓶)	30mL: 次亜塩素酸ナトリウム3g	ビーブランド・メ ディコーデンタル	貼付:根管拡大後、小綿 球に十分浸し根管内に 貼付。 洗滌:根管口を拡大後、 本剤を注入しながらリ ーマー及びファイルで根 端 孔部まで拡大し、次いで 本剤を根管内に満たし、 探針で洗滌。	齶窩及び根管の清掃・消 毒及び内容物の溶解	
歯科用ヨード・グリセリン 25mL「日薬」 (薬価未収載. 納入価:1,900/1瓶)	25mL: ヨウ素2.5g、ヨウ化カリウ ム2g、硫酸亜鉛水和物 0.25g	日本歯科 薬品	適量を綿球又は綿繊維 につけ、局所に貼付。	口腔粘膜(歯肉)及び根 管の消毒	
ネオダイン粉末50g、ネオ ダイン液10mL (薬価未収載. 納入価:粉末2,330、液 750)	粉末50g: 酸化亜鉛30g 液10mL: ユージノール10mL	ネオ製薬 工業	セメント練板上にて粉末 と液剤を練和し、パスタ 状として用いる。	歯髄の鎮痛、鎮静及び 象牙質の消毒を兼ねた 仮封、歯髄覆罩。	

2) 規格追加薬品

薬品名	成分	メーカー	薬効分類	備考	依頼科
ハーセプチン注射用 60mg (薬価:19,547/1瓶)	1瓶:トラスツズマブ60mg	中外	分子標的治療薬	ハーセプチン注射用150mg (薬価:45,512/1瓶)併用	薬剤部

3) 販売中止に伴う変更薬品(在庫なくなり次第)

薬品名	成分	メーカー	薬効分類	備考	依頼科
ウロナーゼ静注用 6万単位 (薬価:2,790/1瓶)	1瓶: ウロキナーゼ60000単位	持田製薬	繊維素溶解酵素製剤	ウロキナーゼ注「フジ」 60,000 (薬価:1,030/1瓶)から変更	薬剤部
エネマスター注腸散400g (薬価:580/1袋)	1袋: 硫酸バリウム392.4g	伏見	X線造影剤	ネオダルムゾル (薬価:528/1本)販から変更	

4) 変更薬品(在庫なくなり次第)

変更前薬品名		変更後薬品名
1 グラマリール錠25mg	→	チアプリド錠25mg「日新」
2 アスペノンカプセル20	→	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
3 イトリゾールカプセル50	→	イトラコナゾール錠50「MEEK」
4 ガナトン錠50mg	→	イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」
5 リスミー錠2mg	→	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」

5) 削除薬品

販売中止による削除

・フランセチン・T・パウダー

期限切れにつき下記の薬品削除

- ・カルベニン点滴用0.25g(カルバペネム系抗菌薬)
- ・カルベニン点滴用0.5g(カルバペネム系抗菌薬)
- ・サイトテック錠100(プロスタグランジン製剤)
- ・ラジレス錠150mg(レニン阻害薬)