

関係各位

薬局だより

薬剤部

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

- 1) 新規採用薬品(12月1日～。なお、オキシコンチンTR錠(各種)・献血ヴェノグロブリンIH10%(各種)・マキサカルトール静注透析用シリンジ(各種)については在庫なくなり次第随時)

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
ソラクトD輸液500mL (薬価:157/1袋)	1袋/500mL: ブドウ糖25g、塩化ナトリウム3g、塩化カリウム0.15g、塩化カルシウム水和物0.1g、L-乳酸ナトリウム1.55g	テルモ	1回500~1000mLを点滴静注。 投与速度:ブドウ糖として1時間あたり0.5g/kg体重以下	細胞外液の補給・補正、代謝性アシドーシスの補正、エネルギーの補給	小児救急科
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (薬価:219.40/1g)	1.01g: クラブラン酸カリウム42.9mg・アモキシシリン水和物600mg	グラクソ・スミス・クライン	小児:1日量96.4mgを2回に分けて12時間ごとに食直前に経口投与。	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎	小児救急科
ナルサス錠 2mg (薬価:202.80/1錠) 6mg (薬価:530.20/1錠)	1錠: ヒドロモルフォン 2mg 6mg	第一三共	1日1回4~24mgを経口投与。	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	頭頸部外科
ナルラピド錠1mg (薬価:110.60/1錠)	1錠: ヒドロモルフォン1mg	第一三共	1日4~24mgを4~6回に分割経口投与。	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	頭頸部外科
オキシコンチンTR錠 5mg (薬価:134.70/1錠) 20mg (薬価:468.80/1錠)	1錠: オキシコドン塩酸塩 5mg 20mg	塩野義	1日10~80mgを2回に分割経口投与。	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	緩和ケア内科
ペルサンチン静注10mg (薬価:58.00/1管)	1管/2mL: ジピリダモール10mg	ベーリンガー・インゲル・ハイム	1回10mgを1日1~3回徐々に静注。	狭心症、心筋梗塞、その他の虚血性心疾患、うっ血性心不全	集中治療部
クロザリル錠 25mg (薬価:87.70/1錠) 100mg (薬価:309.20/1錠)	1錠: クロザピン 25mg 100mg	ノバルティス	初日は12.5mg、2日目は25mgを1日1回経口投与。3日目以降は症状に応じて1日25mgずつ増量し、原則3週間かけて1日200mgまで増量するが、1日量が50mgを超える場合には2~3回に分けて経口投与。ただし、最高用量は1日600mgまで。	治療抵抗性統合失調症	精神科

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
タモキシフェン錠10mg 「MYL」 (薬価:79.10/1錠)	1錠: タモキシフェン10mg	マイランEPD	1日20mgを1~2回に分 割経口投与。1日最高量 は40mgまで。	乳癌	乳腺外科
オキノーム散2.5mg (薬価:57.60/1包)	1包: オキシコドン塩酸塩 2.5mg	塩野義	1日10~80mgを4回に分 割経口投与。	中等度から高度の疼痛 を伴う各種癌における鎮 痛	
リュープリンPRO注射用 キット22.5mg (薬価:94,108.00/1筒)	1筒/1mL: リュープロレリン酢酸塩 22.5mg	武田	24週に1回22.5mgを皮下 投与。	前立腺癌、閉経前乳癌	
サビーン点滴静注用 500mg (薬価:45,593.00/1瓶)	1瓶: デクスラゾキサソ500mg	キッセイ	1日1回、投与1日目及び2日 目は1000mg/m ² 、3日目は 500mg/m ² を1~2時間かけ て3日間連続で静脈内投 与。なお、血管外漏出後6時 間以内に可能な限り速やか に投与開始。投与2日目及 び3日目は投与1日目と同時 刻に投与開始。	アントラサイクリン系抗悪 性腫瘍剤の血管外漏出	呼吸器 内科
イミフィンジ点滴静注 120mg (薬価:112,938/1瓶) 500mg (薬価:458,750/1瓶)	1瓶: デュルバルマブ 120mg/2.4mL、 500mg/10mL	アストラ ゼネカ	1回10mg/kgを2週間間 隔で60分以上かけて 点滴静注。投与期間は 12カ月間まで。	切除不能な局所進行の 非小細胞肺癌における 根治的化学放射線療法 後の維持療法	
ノバントロン注 10mg (薬価:20,340.00/1瓶) 20mg (薬価:36,434.00/1瓶)	1瓶: ミトキサントロン 10mg/5mL 20mg/10mL	あすか	<急性白血病(慢性白血病 の急性転化を含む)> 1日1回2~5mg/m ² を5日間 連日、3~4週間隔でゆっく り静脈内投与。 <悪性リンパ腫、乳癌> 1日1回2~4mg/m ² を5日間 連日あるいは1回8~14mg/ m ² を、3~4週間隔でゆっく り静脈内投与。	急性白血病(慢性骨髄性 白血病の急性転化を含 む)、悪性リンパ腫、乳 癌、肝細胞癌	血液内科
アクラシノン注射用20mg (薬価:3,118.00/1瓶)	1瓶: アクリルピシン塩酸塩 20mg	アステラス	<固形癌及び悪性リンパ腫> (1)1日量40~50mg(力 価)0.8~1.0mg(力価)/kgを 1週間に2回、1、2日連日ま たは1、4日に静脈内または 点滴投与。 (2)1日量20mgを7日間連日 静脈内または点滴投与後、 7日間休薬し、これを反復。 <急性白血病> 1日量20mg(0.4mg(力 価)/kg)を7日間を10~15日 間連日静脈内または点滴投 与。	胃癌、肺癌、乳癌、卵巣 癌、悪性リンパ腫、急性 白血病の自覚的ならび に他覚的症候の寛解お よび改善	
アドセトリス点滴静注用 50mg (薬価:465,701/1瓶)	1瓶: ブレソキシマブベドチン 55mg	武田	<未治療CD30陽性ホジキン リンパ腫> ドキシソルピシン塩酸塩、ピン プラスチン硫酸塩及びダカ ルバジンとの併用におい て、2週間に1回1.2mg/kgを 最大12回点滴静注。 <再発又は難治性CD30陽 性ホジキンリンパ腫及び未 分化大細胞リンパ腫> 3週間に1回1.8mg/kgを点滴 静注。	CD30陽性の下記疾患: ホジキンリンパ腫 再発又は難治性の未分 化大細胞リンパ腫	

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
ガザイバ点滴静注 1000mg (薬価: 450,457/1瓶)	1瓶/40mL: オビヌツズマブ1000mg	中外	1日1回1000mgを点滴静注。 導入療法は、以下のサイクル期間及び投与サイクル数とし、1サイクル目は1、8、15日目、2サイクル目以降は1日目に投与。維持療法では、単独投与により2カ月に1回、最長2年間、投与を繰り返す。 ○シクロホスファミド水和物、ドキシソルピシン塩酸塩、ピンクリスチン硫酸塩及びブレドニゾン又はメチルブレドニゾン併用の場合、3週間を1サイクルとし、8サイクル ○シクロホスファミド水和物、ピンクリスチン硫酸塩及びブレドニゾン又はメチルブレドニゾン併用の場合、3週間を1サイクルとし、8サイクル ○ベンダムスチン塩酸塩併用の場合、4週間を1サイクルとし、6サイクル	CD20陽性の濾胞性リンパ腫	
ジャドニュー顆粒分包 360mg (薬価: 5,707.70/1包)	1包: デフェラシロクス90mg	ノバルティス	1日1回12mg/kg経口投与。なお、1日量は18mg/kgを超えないこと。	輸血による慢性鉄過剰症 (注射用鉄キレート剤治療が不適当な場合)	血液内科
献血ヴェノグロブリン IH10%静注 2.5g/25mL (薬価: 20,525.00/1瓶) 5g/50mL (薬価: 38,547.00/1瓶) 20g/200mL (薬価: 154,188.00/1瓶)	1瓶: 人免疫グロブリンG 2.5g/25mL 5g/50mL 20g/200mL	日本血液製剤機構	直接静注する場合は、きわめて緩徐に行うこと。 詳細は添付文書参照。	1. 低並びに無ガンマグロブリン血症 2. 重症感染症における抗生物質との併用 3. 特発性血小板減少性紫斑病 4. 川崎病の急性期 5. 多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善(ステロイド剤が効果不十分な場合に限り) 6. 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多発性運動ニューロパチーを含む)の筋力低下の改善 7. 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多発性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制(筋力低下の改善が認められた場合) 8. 全身型重症筋無力症(ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限り) 9. 天疱瘡(ステロイド剤の効果不十分な場合) 10. 血清IgG2値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制(ワクチン接種による予防及び他の適切な治療を行っても十分な効果が得られず、発症を繰り返す場合に限り) 11. 水疱性類天疱瘡(ステロイド剤の効果不十分な場合) 12. ギラン・バレー症候群(急性増悪期で歩行困難な重症例)	
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (薬価: 2,885.70/1枚)	1枚/ニューニット 15.2cm × 22.9cm: 酸化セルロース	ジョンソン・エンド・ジョンソン	出血部位に適当量をあてるか充填する。止血の達成後、余剰分は可能な限り取り除く。	各種手術時の補助的な止血	心臓血管外科

薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症	依頼科
レンビマカプセル4mg (薬価:3,956.40/1Cp)	1Cp: レンパチニブ4mg	エーザイ	<根治切除不能な甲状腺癌> 1日1回24mg経口投与。 <切除不能な肝細胞癌> 体重60kg以上の場合は 12mg、体重60kg未満の 場合は8mgを1日1回経口投 与。	根治切除不能な甲状腺 癌、 切除不能な肝細胞癌	消化器 内科
プラケニル錠200mg (薬価:418.90/1錠)	1錠: ヒドロキシクロロキン 硫酸塩200mg	サノフィ	200mg又は400mgを1日 1回食後に経口投与す る。	皮膚エリテマトーデス、 全身性エリテマトーデス	腎臓内科
プララエント皮下注75mg ペン (薬価:22,948.00/1筒)	1筒/1mL: アリロクマブ75mg	サノフィ	75mgを2週に1回皮下投 与。	家族性高コレステロール 血症、高コレステロール 血症(ただし、HMG-CoA 還元酵素阻害剤で効果 不十分な場合に限る)	循環器 内科
マキサカルシトール静注 透析用シリンジ 2.5μg「フソー」 (薬価:446.00/1筒) 5μg「フソー」 (薬価:564.00/1筒)	1筒/1mL: マキサカルシトール 2.5μg 5μg	扶桑	透析終了直前に、 1回2.5~10μgを週3回、 透析回路静脈側に注 入。1回20μgを上限に 漸増。	維持透析下の二次性副 甲状腺機能亢進症	血液 浄化部
アーガメイト20%ゼリー 25g (薬価:80.70/1個)	1個/25g: ポリスチレンスルホン酸 カルシウム5g	アステラス	1日75~150g(ポリステ レンスルホン酸カルシウム として15~30g)を2~3回 に分割投与。	急性および慢性腎不全 に伴う高カリウム血症	
サムチレール内用懸濁 液15% (薬価:1,727.60/1包)	1包/5mL: アトバコン750mg	グラクソ・ スミス クライン	<治療> 1回5mL(アトバコンとして 750mg)を1日2回21日間食 後投与。 <発症抑制> 1回10mL(アトバコンとして 1500mg)を1日1回食後投 与。	ニューモシスチス肺炎、 ニューモシスチス肺炎の 発症抑制	
ツムラ芍薬甘草湯エキス 顆粒(医療用) (薬価:7.00/1g)	7.5g: 日局カンゾウ 6.0g 日局シャクヤク 6.0g	ツムラ	1日7.5gを2~3回に分割 し、食前又は食間に経口 投与。	急激におこる筋肉のけい れんを伴う疼痛、筋肉・ 関節痛、胃痛、腹痛	
フォリアミン錠 (薬価:9.60/1錠)	1錠: 葉酸5mg	日本製薬	成人:1日5~20mg、 小児:1日5~10mgを2~3 回に分割経口投与。	1.葉酸欠乏症の予防及び治 療 2.葉酸の需要が増大し、食 事からの摂取が不十分な際 の補給(消耗性疾患、妊娠 婦、授乳婦等) 3.吸収不全症候群(スプルー 等) 4.悪性貧血の補助療法 5.下記疾患のうち、葉酸の 欠乏又は代謝障害が関与 すると推定される場合 ●栄養性貧血 ●妊娠性貧 血 ●小児貧血 ●抗けい れん剤、抗マラリア剤投与 に起因する貧血 6.アルコール中毒及び肝疾 患に関連する大赤血球性貧 血 7.再生不良性貧血 8.顆粒球減少症	薬剤部
ピソノテープ4mg (薬価:81.90/1枚)	1枚: ピソプロロール4mg	トーア エイヨー	8mgを1日1回、胸部、上腕部 又は背部のいずれかに貼 付。なお、最大投与量は8 mg。	本態性高血圧症(軽症~ 中等症)	

2) 変更薬品(在庫なくなり次第)

変更前薬品名		変更後薬品名
1 タミフルカプセル75	→	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
2 セロクエル25mg錠	→	クエチアピン錠25mg「明治」
3 セロクエル100mg錠	→	クエチアピン錠100mg「明治」
4 フルコナゾールカプセル100mg「F」	→	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
5 スミルスチック3% (三笠製薬)	→	スミルスチック3% (大正富山)

3) 削除薬品

・オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	}	オキシコンチンTR採用に伴い削除
・オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」		
・献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL	}	10%献血ヴェノグロブリン採用に伴い削除
・献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL		
・マキサカルシトール静注透析用2.5μg「テバ」		
・サングロポール点滴静注用2.5g (販売中止により削除)		
・アブレース錠100mg	}	期限切れに伴い削除
・カリクレイン錠10単位		
・メプチン錠50μg		
・トパルジック軟膏1%		
・フルマリン静注用0.5g		