

関係各位

**薬局だより**

薬剤部

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

## 1) 新規採用薬品(5月7日～)

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症
眼科	グラナテック点眼液0.4% 5mL (薬価:449.30/1mL)	1mL: リバスジル4mg	興和	1回1滴、1日2回点眼。	他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない緑内障、高眼圧症
	アイファガン点眼液0.1% 5mL (薬価:448.90/1mL)	1mL: プリモニジン酒石酸塩 1mg	千寿		
脊椎脊髄外科	タリージェ錠 5mg (薬価:107.70/1錠) 10mg (薬価:148.70/1錠)	1錠: ミロガバリン 5mg、10mg	第一三共	初期用量1回5mgを1日2回経口投与し、その後1回用量として5mgずつ1週間以上の間隔をあげて漸増し、1回15mgを1日2回経口投与。	末梢性神経障害性疼痛
小児科	ネキシウム懸濁用顆粒 分包10mg (薬価:80.60/1包)	1包: エソメプラゾール10mg	アストラ ゼネガ	1.成人には1回20mgを用時懸濁して1日1回投与。また、再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、1回10～20mgを投与。1歳以上の幼児及び小児には、体重20kg未満では1回10mgを、体重20kg以上では症状に応じて1回10～20mgを用時懸濁して1日1回投与する。なお、通常、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎では8週間まで、十二指腸潰瘍では6週間までの投与。 2.成人、1歳以上の幼児及び小児には、1回10mgを用時懸濁して1日1回投与。なお、4週間までの投与。 3.成人には1回20mgを用時懸濁して1日1回投与。 4.成人には1回20mgを用時懸濁して、アモキシシリン水和物として1回750mg及びクラリスロマイシンとして1回200～400mgの3剤を同時に1日2回、7日間投与する。この除菌治療が不成功の場合は、成人には1回20mgを用時懸濁して、アモキシシリン水和物として1回750mg及びメトロニダゾールとして1回250mgの3剤を同時に1日2回、7日間投与。	1.胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群、逆流性食道炎 2.非びらん性胃食道逆流症 3.非ステロイド性抗炎症薬、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 4.次のヘリコバクター・ピロリの除菌の補助(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎)

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症
放射線科	アシアロシンチ注 (薬価: 82.60/1MBq)	1瓶/1mL: ガラクトシル人血清アル ブミンジエチレントリアミ ン五酢酸 テクネチウム ( <sup>99m</sup> Tc) 185MBq	日本メジフ ジックス	185MBqを静脈内投与 し、胸腹部前面に検出器 を向け、投与直後から経 時的にシンチグラムを得 ると共に、データ収集及 び処理を行う。	シンチグラフィによる肝 臓の機能及び形態の診 断
集中 治療部	ポララミン注5mg (薬価: 58/1管)	1管/1mL: d-クロルフェニラミンマ レイン酸塩5mg	高田	1回5mgを1日1回皮下、 筋肉内又は静脈内注 射。	蕁麻疹、枯草熱、皮膚疾 患に伴うそう痒、アレルギー性 鼻炎、血管運動 性鼻炎
精神科	レキサルティ錠1mg (薬価: 268.90/1錠)	1錠: プレクスピプラゾール 1mg	大塚製薬	1日1回1mgから投与を 開始した後、4日以上の間 隔をあけて増量し、1回 2mgを投与。	統合失調症
	オランザピンOD錠10mg 「DSEP」 (薬価: 112.60/1錠)	1錠: オランザピン10mg	第一三共 エスファ	1.5~10mgを1日1回とし投 与開始し、維持量として1回 10mg投与。最大量は1回 20mg。 2.10mgを1日1回とし投与開 始。最大量は1回20mg。 3.5mgを1日1回とし投与開 始し、維持量として1回10mg 投与。最大量は1回20mg。 4.他の制吐剤との併用にお いて、5mgを1日1回投与。最 大量は1回10mg。	1.統合失調症 2.双極性障害における 躁症状 3.うつ症状の改善 4.抗悪性腫瘍剤投与に 伴う消化器症状
脳神経 外科	リクシアナOD錠60mg (薬価: 545.60/1錠)	1錠: エドキサパン60mg	第一三共	体重60kg以下に30mg、 体重60kg超に60mgを1日 1回投与。なお、腎機能、 併用薬に応じて1回30mg に減量。	非弁膜症性心房細動患 者における虚血性脳卒 中及び全身性塞栓症の 発症抑制 静脈血栓塞栓症の治療 及び再発抑制
整形外科	イベニティ皮下注105mg シリンジ (薬価: 24,720/1筒)	1筒/1.17mL: ロモズマブ(遺伝子組 換え)105mg	アステラス	210mg(2筒)を1か月に1 回、12か月皮下投与す る。	骨折の危険性の高い骨 粗鬆症
呼吸器 内科	フェントステープ0.5mg (薬価: 303.80/1枚)	1枚: フェンタニル0.5mg	協和発酵 キリン	オピオイド鎮痛剤から切 り替えて使用し、胸部、 腹部、上腕部、大腿部等 に貼付し、1日(約24時 間)毎に貼り替えて使 用。	非オピオイド鎮痛剤及び 弱オピオイド鎮痛剤で治 療困難な中等度から高 度の疼痛を伴う各種癌ま たは慢性疼痛における 鎮痛

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症
消化器 内科	エプクルーサ配合錠 (薬価:60,154.50/1錠)	1錠: ソホスビル400mg・ ベルパタスビル100mg	ギリアド・ サイエンシズ	1.リバビリンとの併用において、1日1回1錠を24週間投与。 2.1日1回1錠を12週間投与。	1.前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 2.C型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
	ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4mL (薬価:62,596/1筒)	1筒/0.4mL: アダリムマブ(遺伝子組換え)40mg	エーザイ	1.体重15kg以上30kg未満の場合は20mgを、体重30kg以上の場合は40mgを2週に1回、皮下注。 2.40mgを2週に1回、皮下注。最大量は80mg。 3.初回に160mgを、2週間後に80mgを、4週間後以降は、40mgを毎週1回、皮下注。 4.初回に80mgを、以後2週に1回、40mgを皮下注。最大量は80mg。 5.初回に160mgを、2週間後に80mgを、4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注。 6.初回に160mgを、2週間後に80mgを、4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注。最大量は80mg。 7.初回に80mgを、1週間後に40mgを、3週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注。	1.既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 2.関節リウマチ、強直性脊椎炎 3.化膿性汗腺炎 4.既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬 5.腸管型ベーチェット病、既存治療で効果不十分な中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療 6.既存治療で効果不十分な中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法 7.非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎注。

2) 剤型変更(在庫なくなり次第)

依頼科	薬品名	成分	メーカー	薬効分類	備考
薬剤部	サンリズム注射液50 (薬価:613/1管)	1管/5mL: ピルシカイニド塩酸塩水和物50mg	第一三共	クラスIc抗不整脈薬	ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」(薬価:407/1管)から変更
	ソル・メドロール静注用 40mg (薬価:375/1瓶) 125mg (薬価:803/1瓶) 500mg (薬価:2,410/1瓶) 1000mg (薬価:4,423/1瓶)	1筒: メチルプレドニゾン 40mg 125mg 500mg 1000mg	ファイザー	副腎皮質ホルモン剤	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射液40mg、125mg、500mg、1000mg「AFP」(薬価:180、321、964、1,769/1瓶)から変更
	パッチテスト試薬金属 15品目セット包装 (薬価:/1セット)	1セット: 塩化アルミニウム20mg、塩化コバルト20mg、塩化第二スズ10mg、塩化第二鉄20mg、ヘキサクロロ白金酸5mg、塩化パラジウム10mg、塩化マンガン20mg、三塩化インジウム10mg、四塩化イリジウム10mg、臭化銀20mg、重クロム酸カリウム5mg、硫酸クロム20mg、硫酸ニッケル50mg、塩化亜鉛20mg、テトラクロロ金酸2mg、硫酸銅10mg、塩化第二水銀0.5mg	鳥居	アレルギー性皮膚疾患の検査薬	パッチテスト試薬金属16品目セット包装(薬価:/1セット)

3) 変更薬品(在庫なくなり次第)

変更前薬品名		変更後薬品名
1 ユリーフ錠4mg	→	シロドシンOD錠4mg「DSEP」
2 ケフレックスカプセル250mg	→	セファレキシンカプセル250mg「トーフ」
3 アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」	→	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」
4 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	→	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」

4) 削除薬品

- ・ヒベルナ注25mg (ポララミン注5mg採用に伴い削除)
- ・エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」 (販売中止により削除)
- ・タケブロン静注用30mg (同効薬品目削減検討により削除)