

関係各位

薬局だより

薬剤部

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

1) 新規採用依頼薬品(1/1～)

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
呼吸器内科	パルミコート200 μ gター ピュヘイラー56吸入 (薬価:1,346.10/瓶)	1瓶/56吸入:ブデソニド 11.2mg	アストラゼネ カ	通常、成人には、ブデソニドとして1回100～400 μ gを1日2回吸入投与する。 なお、症状に応じて増減するが、1日の最高量は1600 μ gまでとする 通常、小児には、ブデソニドとして1回100～200 μ gを1日2回吸入投与する。 なお、症状に応じて増減するが、1日の最高量は800 μ gまでとする。 また、良好に症状がコントロールされている場合は100 μ g1日1回まで減量できる	気管支喘息
呼吸器内科	ビベスピエアロスフィア 28吸入 (薬価:1,787/キット)	1キット/28吸入:グリコピ ロニウム臭化物9.1 μ g+ ホルモテロールフマル 酸塩水和物5.0 μ g	アストラゼネ カ	通常、成人には、1回2吸入(グリコピロニウムとして14.4 μ g、ホルモテロールフマル酸塩として9.6 μ g)を1日2回吸入投与する	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 β 2刺激剤の併用が必要な場合)
循環器内科	フォシーガ錠5mg (薬価:195.1/錠)	1錠:ダパグリフロジン5mg	アストラゼネ カ	-2型糖尿病:通常、成人にはダパグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる -1型糖尿病:インスリン製剤との併用において、通常、成人にはダパグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる	2型糖尿病 1型糖尿病

2) 変更薬品(在庫なくなり次第)

変更前薬品名		変更後薬品名
・ドパミン塩酸塩点滴静注50mg「NP」	→	イノバン注50mg
・タルメア軟膏0.1%	→	アルメタ軟膏0.1%
・インタール細粒10%	→	クロモグリク酸Na細粒10%「TCK」
・タリオンOD錠10mg	→	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」

3) 削除薬品(在庫なくなり次第随時)

・注射用GRF住友100	}	:(販売中止による削除)
・コールタイジン点鼻液		:(使用頻度減少による削除)
・オフサロン点眼液		
・ケイセントラ静注用500		
・セレベント50ディスカス		:(ビベスピ採用に伴う削除)
・フルタイト200ディスカス		:(パルミコート採用に伴う削除)
・スーグラ錠50mg		:(フォシーガ採用に伴う削除)