

関係各位

**薬局だより**

薬剤部

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

## 1) 新規採用依頼薬品

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
循環器内科・血液腫瘍内科	ロケルマ懸濁用散分包5g (薬価:1,095.2/包)	1包(5g):ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム5g	アストラゼネカ	通常、成人には、開始用量として1回10gを水で懸濁して1日3回、2日間経口投与する。なお、血清カリウム値や患者の状態に応じて、最長3日間まで経口投与できる。以後は、1回5gを水で懸濁して1日1回経口投与する。なお、血清カリウム値や患者の状態に応じて適宜増減するが、最高用量は1日1回15gまでとする。  血液透析施行中の場合には、通常、1回5gを水で懸濁して非透析日に1日1回経口投与する。なお、最大透析間隔後の透析前の血清カリウム値や患者の状態に応じて適宜増減するが、最高用量は1日1回15gまでとする。	高カリウム血症

## 2) 変更薬品(在庫なくなり次第)

**変更前薬品名**

- ・ビソルボン錠4mg
- ・0.1w/v%ジアミトール水5L
- ・乳石錠500mg「ファイザー」
- ・イトラコナゾール錠50「MEEK」
- ・スルバシリン静注用3g
- ・セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」
- ・チモプトールXE点眼液0.5%
- ・ファンガード点滴用50mg

**変更後薬品名**

- ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「サワイ」
- 逆性石けん液0.1「ヨシダ」5L
- 乳酸カルシウム「コザカイ・M」1g分包品
- イトラコナゾール錠50mg「科研」
- ユナスピン静注用3g
- セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
- チモロールXE点眼液0.5%「ニッター」
- ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」

3) 削除薬品(在庫なくなり次第随時)

- ・レクチゾール錠25mg : (使用頻度減少による削除)
- ・サイトテック錠100 : (使用頻度減少による削除)
- ・ハッカ水「ケンエー」 : (使用頻度減少による削除)
- ・ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 : (使用頻度減少による削除)
- ・ヨードコート軟膏0.9% : (使用頻度減少による削除)
- ・レボトミン筋注25mg : (使用頻度減少による削除)
- ・ミルセラ注シリンジ50  $\mu$ g・100  $\mu$ g : (使用頻度減少による削除)
- ・ラクティオンパップ70mg : (使用頻度減少による削除)

4) 採用区分変更薬品

【通常採用】→【患者限定採用】へ変更

- ・ゾフルーザ錠10mg・20mg
- ・アーガメイト20%ゼリー
- ・ビクロックスシロップ8%