

関係各位

薬局だより

薬剤部

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

1) 新規採用依頼薬品

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
血液腫瘍 内科	ベポタスチンベシル酸塩 OD錠10mg「タナベ」(薬 価:15.4/錠)	1錠:ベポタスチンベシル酸 塩10mg	ニプロ ES	<p><成人> 通常、成人にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する なお、年齢、症状により適宜増減する</p> <p><小児> 通常、7歳以上の小児にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する 用法用量に関連する使用上の注意 本剤は口腔内で速やかに崩壊することから唾液のみ(水なし)でも服用可能であるが、口腔粘膜からの吸収により効果発現を期待する製剤ではないため、崩壊後は唾液又は水で飲み込むこと</p>	<p><成人> アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症)</p> <p><小児> アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒</p>
薬剤部	インスリンリスプロBS注 ソロスターHU「サノフィ」 (薬価:1,203/キット)	1キット(3mL):インスリンリスプロ(遺伝子組み換え)300単位	サノフィ	通常、成人では1回2~20単位を毎食直前に皮下注射するが、ときに回数を増やしたり、持続型インスリン製剤と併用したりすることがある 投与量は、患者の症状及び検査所見に応じて適宜増減するが、持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量としては通常1日4~100単位である	インスリン療法が適応となる糖尿病

2) 変更薬品(在庫なくなり次第)

変更前薬品名

- ・パンテノール注100mg「KCC」
- ・ブシラミン錠50mg「トーワ」
- ・ナテグリニド錠90mg「日医工」
- ・アンブロキシオール塩酸塩錠5mg「日医工」
- ・バンコマイシン塩酸塩散0.5「MEEK」
- ・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」
- ・ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」

変更後薬品名

- パントール注100mg
- リマチル錠50mg(患者限定)
- スターシス錠90mg
- アンブロキシオール塩酸塩錠5mg「タカタ」
- バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
- バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
- ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」

- ・ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」 → ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」
- ・サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 → サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NP」
- ・ジラセプ塩酸塩錠50mg「日医工」 → ジラセプ塩酸塩錠50mg「日新」
- ・トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 → トリアゾラム錠0.25mg「FY」

3) 削除薬品(在庫なくなり次第随時)

- ・エレルサ錠50mg/グラジナ錠50mg : (販売中止に伴う削除)
- ・ゾメタ点滴静注4mg/100mL : (出荷調整解除に伴う削除)
- ・ビクロックスシロップ8% : (出荷調整に伴う削除)
- ・フィニバックス点滴静注用0.25g : (使用量減少による削除)

4) 採用区分変更/剤形変更薬品

①【通常採用】→【患者限定】へ変更

- ・エポジン皮下注シリンジ24000
- ・セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」
- ・ニポラジン錠
- ・プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」
- ・ベザフブラート徐放錠200mg「JG」

②規格追加

- ・プロポフォール1%静注20mL「マルイシ」