

関係各位

薬局だより

薬剤部 医薬品情報管理

定例薬事委員会において新規採用薬品等を下記のように決定いたしました。

1) 新規採用薬品

・全科新規採用薬品: 下記の通り

なし

・診療科限定新規採用薬品: 下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
産婦人科	テブダック点滴静注用 40mg (薬価: 252,241/瓶)	1バイアル: チソツマブ ペドテン(遺伝子組換え) 40mg	ジェンマブ	通常、成人にはチソツマブ ペドテン(遺伝子組換え)として1回2mg/kg(体重)を30分以上かけて、3週間間隔で点滴静注する。ただし、1回量として200mgを超えないこと。なお、患者の状態により適宜減量する。	がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌
呼吸器内科 血液腫瘍内科	アクテムラ点滴静注用 80mg・400mg (薬価: 80mg: 10,281/瓶 400mg: 51,743/瓶)	80mg: 1バイアル(4mL)中 トシリズマブ(遺伝子組換え) 80mg 400mg: 1バイアル(20mL)中 トシリズマブ(遺伝子組換え) 400mg	中外	＜関節リウマチ及び多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎＞ 通常、トシリズマブ(遺伝子組換え)として1回8mg/kgを4週間隔で点滴静注する。 ＜全身型若年性特発性関節炎、成人発症スチル病及びキャッスルマン病＞ 通常、トシリズマブ(遺伝子組換え)として1回8mg/kgを2週間隔で点滴静注する。なお、症状により1週間まで投与間隔を短縮できる。 ＜悪性腫瘍治療に伴うサイトカイン放出症候群＞ 通常、トシリズマブ(遺伝子組換え)として体重30kg以上は1回8mg/kg、体重30kg未満は1回12mg/kgを点滴静注する。 ＜SARS-CoV-2による肺炎＞ 通常、成人には、副腎皮質ステロイド薬との併用において、トシリズマブ(遺伝子組換え)として1回8mg/kgを点滴静注する。症状が改善しない場合には、初回投与終了から8時間以上の間隔をあけて、トシリズマブ(遺伝子組換え)として8mg/kgを1回追加投与できる。	○既存治療で効果不十分な下記疾患 関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎、成人発症スチル病 ○キャッスルマン病に伴う諸症状及び検査所見(C反応性タンパク高値、フィブリノーゲン高値、赤血球沈降速度亢進、ヘモグロビン低値、アルブミン低値、全身倦怠感)の改善。ただし、リンパ節の摘除が適応とならない患者に限る。 ○悪性腫瘍治療に伴うサイトカイン放出症候群 ○SARS-CoV-2による肺炎(ただし、酸素投与を要する患者に限る)
消化器・肝胆膵外科	テビムブラ点滴静注 100mg (薬価: 214,498/瓶)	チスレリズマブ(遺伝子組換え) 100mg	ビーワン・メディシズ	フルオロウラシル及びシスプラチンとの併用において、通常、成人には、チスレリズマブ(遺伝子組換え)として、1回200mgを3週間間隔で60分かけて点滴静注する。がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌に対しては、本剤を単独投与することもできる。なお、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。	根治切除不能な進行・再発の食道癌

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
小児科	フルミスト点鼻液 (薬価:未収載)	0.2mL中 弱毒生インフルエンザウイルス(A型・B型) 1株当たり 7.0± 0.5Log10FFU	第一三共	2歳以上19歳未満の者に、0.2mLを1回(各鼻腔内に0.1mLを1噴霧)、鼻腔内に噴霧する。	インフルエンザの予防

2) 診療科限定追加薬品:下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
産婦人科	リオナ錠250mg (薬価:70.40/錠)	クエン酸第二鉄水和物を無水物として(クエン酸第二鉄とて)250mg含有	日本たばこ=鳥居	<慢性腎臓病患者における高リン血症の改善> 通常、成人には、クエン酸第二鉄として1回500mgを開始用量とし、1日3回食直後に経口投与する。以後、症状、血清リン濃度の程度により適宜増減するが、最高用量は1日6,000mgとする。 <鉄欠乏性貧血> 通常、成人には、クエン酸第二鉄として1回500mgを1日1回食直後に経口投与する。患者の状態に応じて適宜増減するが、最高用量は1回500mgを1日2回までとする。	鉄欠乏性貧血
呼吸器内科 消化器内科 小児科	ホスリボン配合顆粒 (薬価:71.10/錠)	1包(0.48g)中に、リンとして100mg、成分としてリン酸二水素ナトリウム水和物330mg及び無水リン酸水素二ナトリウム119mg	ゼリア	通常、リンとして1日あたり20～40mg/kgを目安とし、数回に分割して経口投与する。以後は患者の状態に応じて適宜増減するが、上限はリンとして1日あたり3,000mgとする。	低リン血症 →6科となり、全科採用とする
産婦人科	アイファガン点眼液0.1% (薬価:268.90/mL)	1mL中 プリモニジン酒石酸塩1mg 5mL/本	千寿製薬	通常、1回1滴、1日2回点眼する。	次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合 緑内障、高眼圧症

3) 患者限定新規採用薬品: 下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
呼吸器内科	ラズクルーズ錠 80mg/240mg (薬価: 80mg: 4,403.30/錠 240mg: 12,354.70/錠)	80mg: ラゼルチニ ブメシル酸塩水 和物96.48mg (ラゼルチニブとし て80mg) 240mg: ラゼルチ ニブメシル酸塩水 和物289.44mg (ラゼルチニブとし て240mg)	ヤンセン ファーマ	アミバンタマブ(遺伝子組換え)との併 用において、通常、成人にはラゼルチ ニブとして240mgを1日1回経口投与す る。なお、患者の状態により適宜減量 する。	EGFR遺伝子変異陽性 の切除不能な進行・再 発の非小細胞肺癌
精神科	メラトベル顆粒小児用 0.2% (薬価: 207.70/g)	1錠中メラトニン 1mg	ノーベル ファーマ	通常、小児にはメラトニンとして1日1 回1mgを就寝前に経口投与する。な お、症状により適宜増減するが、1日1 回4mgを超えないこと。	小児期の神経発達症に 伴う入眠困難の改善
消化器・ 胆管膵 外科	フリュザクラカプセル 5mg (薬価: 5mg: 28,640.30)	1カプセル中 フルキンチニブと して5mg	武田薬品 工業	通常、成人にはフルキンチニブとして1 日1回5mgを3週間連日経口投与し、 その後1週間休薬する。これを1サイク ルとして投与を繰り返す。なお、患者 の状態により適宜減量する。	がん化学療法後に増悪 した治療切除不能な進 行・再発の結腸・直腸癌
消化器内科	トレムフィア点滴静注 200mg (薬価: 253,045/瓶)	□バイアル20mL 中) グセルクマブ(遺 伝子組換え) 200mg含有	ヤンセン ファーマ	通常、成人にはグセルクマブ(遺伝子 組換え)として、1回200mgを初回、4 週後、8週後に点滴静注する。	中等症から重症の潰瘍 性大腸炎の寛解導入療 法(既存治療で効果不 十分な場合に限る)
精神科	ワイテンス錠2mg (薬価: 2mg/10.20)	1錠中グアナベン ズ酢酸塩(局) 2.525mg(グアナ ベンズとして 2mg)	アルフレッ サファーマ	グアナベンズとして、通常成人1回 2mg1日2回経口投与する。効果が不 十分な場合は、1回4mg1日2回に増 量する。 なお、年齢、症状に応じて適宜増減す る。	本態性高血圧症
消化器内科	トレムフィア点滴静注 200mg (薬価: 253,045/瓶)	□バイアル20mL 中) グセルクマブ(遺 伝子組換え) 200mg含有	ヤンセン ファーマ	通常、成人にはグセルクマブ(遺伝子 組換え)として、1回200mgを初回、4 週後、8週後に点滴静注する。	中等症から重症の潰瘍 性大腸炎の寛解導入療 法(既存治療で効果不 十分な場合に限る)
脳神経内科	クアルソディ髄注100mg (薬価: 2,788,883/瓶)	1バイアル15mL 中 トフェルセン 100mg	バイオジェ ン・ジャパ ン	通常、成人には、トフェルセンとして1 回100mgを1～3分かけて髄腔内投与 する。初回、2週後、4週後に投与し、 以降4週間間隔で投与する。	SOD1遺伝子変異を有す る筋萎縮性側索硬化症 における機能障害の進 行抑制
循環器内科	アムヴトラ皮下注25mg シリンジ (薬価: 7,810,923/筒)	1シリンジ (0.5mL) 中: プト リシランナトリウ ム 26.5mg(プトリシ ランとして25mg)	Alnylam	通常、成人にはプトリシランとして 25mgを3カ月に1回皮下投与する。	○トランスサイレチン型 家族性アミロイドポリ ニューロパチー ○トランスサイレチン型 心アミロイドーシス(野生 型及び変異型)

4) 診療科限定再審議薬品(本採用結果)

- ・ライブリバント点滴静注350mg:診療科限定のままで(呼吸器内科)
- ・ビキセオス配合静注用:診療科限定のままで(血液・腫瘍内科)
- ・トロデルビ点滴静注用200mg:診療科限定のままで(乳腺外科)
- ・エゼロス配合錠HD「サワイ」:診療科限定のままで(循環器内科)
- ・ラリキシンドライシロップ小児用20%:診療科限定のままで(小児科)
- ・アウィクリ注フレックスタッチ 総量300単位:診療科限定のままで(糖尿病・内分泌内科)

5) 販売/供給中止・回収・限定出荷等に伴う変更 (在庫なくなり次第変更予定)

① 販売中止に伴う変更

(変更前薬品名)		(変更後薬品名)
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	→	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	→	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
☐バシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	→	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
キンダベート軟膏0.05%	→	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
YDソリタ-T3号G輸液	→	ソリタ-T3号G輸液

② 供給困難に伴う変更

(変更前薬品名)		(変更後薬品名)
バラシクロビル錠500mg「DSEP」	→	バラシクロビル錠500mg「FFP」

6) 削除薬品(在庫なくなり次第削除予定)

ラジカット点滴静注バッグ30mg	:	期限切れのため削除
ペガシス皮下注90μg	:	販売中止のため削除

7) 採用区分/剤型変更等(在庫なくなり次第変更予定)

① 剤形変更/剤型追加/規格変更/規格追加

(1)剤型変更

【患者】カルケンス錠100mg	:	【患者】カルケンスカプセル100mgより剤型変更
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	:	ランマーク皮下注120mgより剤型変更

(2)規格変更

【患者】ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	:	【患者】ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクターより規格変更
-------------------------------	---	-------------------------------------

(3)剤型・規格変更

ラゲブリオ錠400mg	:	ラゲブリオカプセル200mgより剤型・規格変更
-------------	---	-------------------------

(4)剤型追加

スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	:	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」より剤型追加
----------------------	---	--------------------------------

(5)規格追加

献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	:	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL、5g/50mL、20g/200mLに規格追加
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm1枚	:	タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm1枚に規格追加
【患者】オンボー皮下注200mgオートインジェクター	:	【患者】オンボー皮下注100mgオートインジェクターに規格追加
【患者】トブラシン注60mg	:	【患者】トブラシン注90mgに規格追加
【患者】リベルサス錠14mg	:	【患者】リベルサス錠7mgに規格追加