

関係各位

薬局だより

薬剤部 医薬品情報管理

定例薬事委員会において新規採用薬品等を下記のように決定いたしました。

1) 新規採用薬品

・全科新規採用薬品: 下記の通り

なし

・診療科限定新規採用薬品: 下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
血液・腫瘍内科	ルンスミオ点滴静1mg/30mg (薬価: 1mg: 81,434/瓶) 30mg: 2,327,790/瓶)	1mg: 1バイアル (1mL) 中 モスネツズマブ (遺伝子組換え) 1mg 30mg: 1バイアル (1mL) 中 モスネツズマブ (遺伝子組換え) 30mg	中外製薬	通常、成人にはモスネツズマブ (遺伝子組換え) として、21日間を1サイクルとし、1サイクル目は1日目に1mg、8日目に2mg、15日目に60mg、2サイクル目は1日目に60mg、3サイクル目以降は1日目に30mgを8サイクルまで点滴静注する。8サイクル終了時に、完全奏効が得られた患者は投与を終了し、また、病勢安定又は部分奏効が得られた患者は、計17サイクルまで投与を継続する。	再発又は難治性の濾胞性リンパ腫

2) 診療科限定追加薬品: 下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
消化器内科	アネレム静注用50mg (薬価: 2,218/瓶)	レミマゾラムベシル酸塩69.37mg (レミマゾラムとして51.00mg)	ムンディファーマ	全身麻酔の導入及び維持 ＜導入＞ 通常、成人には、レミマゾラムとして12mg/kg/時の速度で、患者の全身状態を観察しながら、意識消失が得られるまで静脈内へ持続注入する。なお、患者の年齢、状態に応じて投与速度を適宜減速すること。 ＜維持＞ 通常、成人には、レミマゾラムとして1mg/kg/時の速度で静脈内への持続注入を開始し、適切な麻酔深度が維持できるよう患者の全身状態を観察しながら、投与速度を適宜調節するが、上限は2mg/kg/時とする。なお、患者の年齢、状態に応じて投与開始速度を適宜減速すること。 覚醒徴候が認められた場合は、最大0.2mg/kgを静脈内投与してもよい。 ＜消化器内視鏡診療時の鎮静＞ 通常、成人には、レミマゾラムとして3mgを、15秒以上かけて静脈内投与する。効果が不十分な場合は、少なくとも2分以上の間隔を空けて、1mgずつ15秒以上かけて静脈内投与する。なお、患者の年齢、体重等を考慮し、適切な鎮静深度が得られるよう、投与量を適宜減量する。	適応: ○全身麻酔の導入及び維持 ○消化器内視鏡診療時の鎮静
脊椎脊髄外科	オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg (薬価: 16,090/筒)	1カートリッジ (0.75mL) 中 アバロパラチド酢酸塩 1.765mg (アバロパラチドとして1.5mg)	帝人ファーマ	通常、成人には1日1回アバロパラチドとして80μgを皮下に注射する。 なお、本剤の投与は18ヵ月間までとすること。	適応: 骨折の危険性の高い骨粗鬆症

3) 患者限定新規採用薬品:下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
血液・腫瘍内科	セムブリックス錠40mg (薬価:10,618.30/錠)	1錠中アシミニブ塩酸塩21.620mg(アシミニブとして20mg)	ノバルティスファーマ	通常、成人にはアシミニブとして1回80mgを1日1回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	慢性骨髄性白血病
血液・腫瘍内科	イエスカルタ点滴静注 (薬価:32,647,761/患者)	抗CD19 CAR T細胞 (生細胞数として) $1.0 \times 10^6 \sim 2.4 \times 10^6$ 個/kg(体重) (最大許容量 2×10^8 個)	ギリアド・サイエンシズ	〈医療機関での白血球アフエーシス～製造施設への輸送〉 1.白血球アフエーシス 白血球アフエーシスにより、非動員末梢血単核球を採取する。 2.白血球アフエーシス産物の輸送 採取した白血球アフエーシス産物を、2～8℃に設定された保冷輸送箱で梱包して本品製造施設へ輸送する。 〈医療機関での受入れ～投与〉 3.本品の受領及び保存 本品を受領し、使用直前まで液体窒素気相下(−150℃以下)で凍結保存する。 4.投与前の前処置 末梢血リンパ球数等を確認し、必要に応じて前処置として、本品投与の5日前から3日間連続で、以下のリンパ球除去化学療法を行う。 シクロホスファミド(無水物として)500mg/m²を1日1回 3日間点滴静注及びフルダリンリン酸エステル30mg/m²を1日1回3日間点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。 5.本品の投与 通常、成人には抗CD19 CAR T細胞として2.0×10^6個/kg(体重)を目安に(体重100kg以上の患者の最大投与量は2×10^8個を)、5分以上かけて30分を超えないように単回静脈内投与する。なお、本品の再投与はしないこと。	以下の再発又は難治性の ^B 細胞リンパ腫・びまん性大細胞型 ^B 細胞リンパ腫、原発性縦隔大細胞型 ^B 細胞リンパ腫、形質転換濾胞性リンパ腫、高悪性度 ^B 細胞リンパ腫 ただし、CD19抗原を標的としたキメラ抗原受容体発現T細胞輸注療法の治療歴がない患者に限る。
糖尿病・内分泌内科	テPPERザ点滴静注用500mg (薬価:979,920/瓶)	テプロツムマブ(遺伝子組換え) 524mg	アムジェン	通常、成人にはテプロツムマブ(遺伝子組換え)として初回は10mg/kgを、2回目以降は20mg/kgを7回、3週間間隔で計8回点滴静注する。	活動性甲状腺眼症
小児科	アジスロマイシン細粒小児用10%「トーフ」 (薬価:64.10/g) 100g/瓶	日局 アジスロマイシン水和物 104.8mg(アジスロマイシンとして100mg(力価))	東和薬品	小児には、体重1kgあたり10mg(力価)を1日1回、3日間経口投与する。 ただし、1日量は成人の最大投与量500mg(力価)を超えないものとする。	咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、中耳炎

4) 診療科限定再審議薬品(本採用結果)

- ・ダトロウェイ点滴静注用100mg:診療科限定のままで(呼吸器内科)

5) 販売/供給中止・回収・限定出荷等に伴う変更 (在庫なくなり次第変更予定)

① 販売中止に伴う変更

(変更前薬品名)		(変更後薬品名)
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	→	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」
リボスチン点眼液0.025%	→	レボカバスチン点眼液0.025%「TS」
ガスモチン散1%	→	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
ベリチーム配合顆粒0.5g/包	→	ベリチーム配合顆粒1g/包
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	→	エリル点滴静注液30mg
アルロイドG内用液5%「200mL×10本」	→	アルロイドG内用液5%「600mL×5本」
オキシドール消毒用液「マルイシ」	→	オキシドール「ニッコー」

② 供給困難に伴う変更

(変更前薬品名)		(変更後薬品名)
ミオコールスプレー0.3mg	→	ニトロールスプレー1.25mg

③ 出荷停止に伴う変更

(変更前薬品名)		(変更後薬品名)
グラニセトロン静注液1mg「トーワ」	→	グラニセトロン静注液1mg「明治」
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	→	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」

④ 供給困難に伴う変更

(変更前薬品名)		(変更後薬品名)
生理食塩液「ヒカリ」250mL	→	生理食塩液バッグ「フソー」250mL

6) 削除薬品(在庫なくなり次第削除予定)

【全科】アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	:	期限切れのため削除
【患者限定】ピドキサール注30mg	:	期限切れのため削除
【患者限定】エピレオプチマル散50%	:	期限切れのため削除
【患者限定】トフラニール錠10mg	:	期限切れのため削除
【患者限定】クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	:	期限切れのため削除
【患者限定】オダイン錠125mg	:	期限切れのため削除
【患者限定】シルデナフィル錠20mgRE「JG」	:	期限切れのため削除
【患者限定】イムブルピカカプセル140mg	:	期限切れのため削除
【患者限定】エンドキサン錠50mg	:	期限切れのため削除

7) 採用区分/剤型変更等(在庫なくなり次第変更予定)

① 剤形変更/剤型追加/規格変更/規格追加

(1) 剤型変更

プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	:	プラリア皮下注60mgシリンジより剤型変更
------------------------	---	-----------------------