

関係各位

薬局だより

薬剤部 医薬品情報管理

定例薬事委員会において新規採用薬品等を下記のように決定いたしました。

1) 新規採用薬品

・全科新規採用薬品: 下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
救急・集中治療センター	ベリナートP静注用500 (薬価:101,325/瓶)	人C1-インアクテ ベータ-500国際 単位	GSLベー リング	<p><効能共通> 本剤を添付の日局注射用水全量で徐々に溶解し、直接静注するか、点滴静注する。直接静注の場合は、緩徐に行う。</p> <p><遺伝性血管性浮腫の急性発作> 通常、成人には1,000~1,500国際単位を投与する。本剤投与後、数時間以内に効果の発現が認められないか、あるいは、不十分な場合には、500~1,000国際単位を追加投与する。また、24時間後でも症状の改善が不十分な場合には、その症状に応じて繰り返し投与する。</p> <p><侵襲を伴う処置による遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制> 通常、成人には侵襲を伴う処置前の6時間以内に1,000~1,500国際単位を投与する。</p>	<p>○遺伝性血管性浮腫の急性発作</p> <p>○侵襲を伴う処置による遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制</p>

・診療科限定新規採用薬品: 下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症																									
腎臓内科	エムラクリーム 5g (薬価:182.40/g)	1g中 日局 リドカイン 25mg プロピトカイン 25mg	佐藤製薬	<p><成人> 通常、成人には、レーザー照射予定部位又は注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10cm²あたり本剤1gを、密封法(ODT)により60分間塗布する。なお、1回あたりの塗布量は10gまでとし、塗布時間は120分を超えないこと。</p> <p><小児> 通常、小児等には、レーザー照射予定部位又は注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10cm²あたり本剤1gを、密封法(ODT)により60分間塗布する。なお、1回あたりの塗布量及び塗布時間は下表を超えないこと。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年齢(月齢)</th> <th>体重</th> <th>最大塗布量</th> <th>最大塗布時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0~2ヶ月</td> <td>/</td> <td>1g</td> <td>60分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3~11ヶ月</td> <td>5kg以下</td> <td>1g</td> <td>60分</td> </tr> <tr> <td>5kg超</td> <td>2g</td> <td>60分</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1~14歳</td> <td>5kg以下</td> <td>1g</td> <td>60分</td> </tr> <tr> <td>5kg超10kg以下</td> <td>2g</td> <td>120分</td> </tr> <tr> <td>10kg超</td> <td>10g</td> <td>120分</td> </tr> </tbody> </table>	年齢(月齢)	体重	最大塗布量	最大塗布時間	0~2ヶ月	/	1g	60分	3~11ヶ月	5kg以下	1g	60分	5kg超	2g	60分	1~14歳	5kg以下	1g	60分	5kg超10kg以下	2g	120分	10kg超	10g	120分	<p>○皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和</p> <p>○注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和</p>
年齢(月齢)	体重	最大塗布量	最大塗布時間																											
0~2ヶ月	/	1g	60分																											
3~11ヶ月	5kg以下	1g	60分																											
	5kg超	2g	60分																											
1~14歳	5kg以下	1g	60分																											
	5kg超10kg以下	2g	120分																											
	10kg超	10g	120分																											

2) 診療科限定追加薬品:下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
呼吸器内科	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド (薬価:90,969/キット)	ペグフィルグラステム(遺伝子組換え) 3.6mg0.36mL1キット	協和キリン	通常、成人にはがん化学療法剤投与終了後の翌日以降、ペグフィルグラステム(遺伝子組換え)として、3.6mgを化学療法1サイクルあたり1回皮下投与する。	がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制

3) 患者限定新規採用薬品:下記の通り

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法用量	適応症
小児科	ロペミン小児用細粒0.05% (薬価:14.30/g)	(1g中) ロペラミド塩酸塩 0.5mg	ヤンセンファーマ	ロペラミド塩酸塩として、通常、小児に1日0.02~0.04mg/kg(ロペミン小児用細粒0.05%として0.04~0.08g/kg)を2~3回に分割経口投与する。なお、症状により適宜増減する。	急性下痢症
血液腫瘍内科	ブルキンザカプセル80mg (薬価:6,636.10/カプセル)	1カプセル中 ザヌブルチニブ 80mg	ビーワン・メディシンズ	通常、成人にはザヌブルチニブとして1回160mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	○慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む) ○原発性マクログロブリン血症及びびリンパ形質細胞リンパ腫
精神科	ボルズィ錠5mg(薬価:71.10/錠)	1錠中ボルノレキサントとして5mg	Meiji Seika ファルマ	通常、成人にはボルノレキサントとして1日1回5mgを就寝直前に経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日1回10mgを超えないこととする。	不眠症
消化器・肝胆臓外科	テシプール錠1mg(薬価:7.00/錠)	1錠中 セチプチリンマレイン酸塩 1mg	持田製薬	セチプチリンマレイン酸塩として、通常、成人1日3mgを初期用量とし、1日6mgまで漸増し、分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	セチプチリンマレイン酸塩として、通常、成人1日3mgを初期用量とし、1日6mgまで漸増し、分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

4) 診療科限定再審議薬品(本採用結果)

・ルンスミオ点滴静注1mg/30mg:診療科限定のまま(血液・腫瘍内科)

5) 販売/供給中止・回収・限定出荷等に伴う変更(在庫なくなり次第変更予定)

① 販売中止に伴う変更

(変更前薬品名)	(変更後薬品名)
エスポー注射液750	→ エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」

② 供給困難に伴う変更

(変更前薬品名)	(変更後薬品名)
【科】アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	→ 【科】アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」
インスリン リスプロBS注ノロスター HU「サノフィ」	→ インスリン アスパルトBS注ノロスター NR「サノフィ」
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 2.5g/25mL・5g/100mL・10g/100mL・20g/200mL	→ グロベニン-I10%静注 5g/50mL・10g/100mL・20g/200mL

③ 出荷停止・販売移管に伴う変更

・なし

6) 削除薬品(在庫なくなり次第削除予定)

【科】パキロビッドパック600	:	期限切れのため削除
【患者】ペンタサ坐剤1g	:	期限切れのため削除

7) 採用区分/剤型変更等(在庫なくなり次第変更予定)

① 剤型変更/剤型追加/規格変更/規格追加

(1)規格追加

【科】アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	:	【科】アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mLより規格追加
-------------------------------------	---	---------------------------------

(2)規格変更

【科】リプロファズ配合皮下注	:	【科】ライブリバント点滴静注350mg
----------------	---	---------------------

② 採用区分変更

(1)科採用→患者限定へ変更

・ブロメライン軟膏5万単位/g

8) 後発品への変更(在庫なくなり次第変更予定)

①先発→後発への変更

・なし