高カリウム血症治療薬フォーミュラリ

第一推奨薬	第二推奨薬
カリメート経口液20%	**ロケルマ懸濁用散**
25g/包	5g/包
233～467円/日 （薬価：77.8円/包）	**1,024～6,146円/日** （薬価：1,024.3/包）
1日3～6包を2～3回に分け、服用	1回2包を水で懸濁して1日3回、2日間（最長3日間まで） 以後は、1回1包を水で懸濁して1日1回（最高用量は1回3包まで）
・腸閉塞は禁忌 ・便秘・腸管障害に注意 ・Ca型であり血中Ca濃度の上昇に注意 ・水分制限患者に使用可能（水なしで服用可）	・即効性あり（緊急性が高い場合使用） ・非ポリマーで腸管で膨張しない ・開始用量と維持用法が異なる

※1日薬価は小数点以下を四捨五入して表示

参考文献：インタビューフォーム、添付文書
2026年4月初版作成：薬剤部 医薬品情報管理　酒井　直子
監修：腎臓内科　對馬　英雄

成人

高カリウム血症治療薬（内服）
参考資料

監修：腎臓内科　對馬英雄
2026年4月初版作成：薬剤部 医薬品情報管理　酒井直子

推奨	第一推奨薬		第二推奨薬
薬品名	カリメート経口液20%	【患者】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%	ロケルマ懸濁用散分包
一般名	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
規格	25g/包	25g/個	5 g/包
薬価	77.8円/包	77.8円/個	1,005.1円/包
特徴	・高度の便秘に注意 ・Ca型であり血中Ca濃度の上昇に注意 ・高齢者・嚥下困難者にアドヒアランス向上の点で有用 ・水分制限患者に推奨（水なしで投与可能） ・甘みと酸味がある	・高度の便秘に注意 ・Ca型であり血中Ca濃度の上昇に注意 ・高齢者・嚥下困難者にアドヒアランス向上の点で有用	・1日薬価が高い ・カリウム低下作用の効果が早期に発現する ・非ポリマーで腸管で膨張しないため、便秘や消化管穿孔のリスクが低い ・無味無臭
効能･効果	急性及び慢性腎不全に伴う高カリウム血症		高カリウム血症
用法・用量	通常成人1日75～150g（ポリスチレンスルホン酸カルシウムとして1日15～30g）を2～3回に分け、経口投与する。なお、症状により適宜増減する。		通常、成人には、開始用量として1回10gを水で懸濁して1日3回、2日間経口投与する。なお、血清カリウム値や患者の状態に応じて、最長3日間まで経口投与できる。以後は、1回5gを水で懸濁して1日1回経口投与する。なお、血清カリウム値や患者の状態に応じて適宜増減するが、最高用量は1日1回15gまでとする。
腎機能障害時の注意	1日15～30gを分2～分3		腎機能正常者と同じ HD：1日1回5gを非HD日に。最大1日1回15ｇ
懸濁の可否	ー		1包当たり約45mLの水に懸濁
経管投与 必要な液量	1包当たり10～15mLの水で希釈 投与後10mLフラッシュ	×	1包当たり25mLの水に懸濁 投与後10mLフラッシュ
経管投与 外形サイズ	12Fr以上		8Fr以上
禁忌	腸閉塞の患者 ［腸管穿孔を起こすおそれがある］		なし
重大な副作用	腸管穿孔、腸閉塞、大腸潰瘍		低カリウム血症・うっ血性心不全

参考：各薬剤添付文書、各薬剤HP、各薬剤問い合わせ窓口
2026.4.13　奈良県総合医療センター薬事委員会